
[Projets R&D et essais démonstratifs + résultats](#)

[InterHaricot - Gestion de l'interculture longue avant haricot pour lutter contre les adventices, l'érosion et les dégâts de mouche du semis](#)

Datum der Veröffentlichung:
22.07.2025

Teilen

- 
- 
- 
- 

InterHaricot - Projet de développement

Gestion de l'interculture longue avant haricot pour lutter contre les adventices, l'érosion et les dégâts de mouche du semis

La culture du haricot pour l'industrie se sème tard dans la saison, aux environs de la fin mai - début du mois de juin. Ce semis tardif implique une longue interculture pendant laquelle il faut gérer d'une part les risques d'érosion et d'autre part le désherbage des terres à un moment propice à la levée des adventices.

En général, le couvert d'interculture est détruit pendant l'hiver, laissant la parcelle nue jusqu'au semis. Le désherbage de la parcelle jusqu'au semis se fait de manière mécanique par le passage répété de plusieurs outils. Cette technique peut cependant avoir un impact sur l'assèchement du sol qui est accentué par les printemps de plus en plus secs que nous connaissons actuellement. Le manque d'eau pose ensuite problème pour la levée des haricots. Une des solutions envisagées pourrait être le semis d'un deuxième couvert au printemps ou la destruction plus tardive d'un couvert non gélif installé en automne. Le couvert détruit avant le semis permettrait d'éviter le désherbage de la parcelle pendant le printemps et également d'éviter tous problèmes d'érosion. Cependant, la présence

d'un couvert détruit au printemps présente également un risque pour la levée des haricots car la présence de matière organique non décomposée est favorable au développement de populations de mouche du semis. Cette dernière est très problématique notamment en culture de haricot car les larves peuvent engendrer de gros dégâts lors de la levée des plantes.

Ce projet a pour but d'identifier la meilleure interculture avant une culture de haricot. Différents paramètres seront testés : différents couverts et périodes d'implantation (simple ou double couvert), différentes méthodes et périodes de destruction. Les impacts sur les populations d'adventices de la parcelle et sur l'érosion seront observés ainsi que les impacts sur la culture de haricot (dégâts de mouches du semis, levées des plantes).

Ce projet a débuté le 1 novembre 2023 et se clôturera le 30 septembre 2025. Les résultats sont attendus pour fin 2025.

Coordinatrice : Julie Legrand, du CPL-Végémar.

Cadre de financement: Appel 2024 aux Centres Pilotes pour des essais en production biologique de la Région wallonne (Action 11_L4 du plan bio 2030)

Suivi administratif du projet: Direction de la Recherche et du Développement (SPW-ARNE)

Praktische Informationen

Veröffentlicht am:

22.07.2025

Aktualisiert:

22.07.2025

Datum des Dokuments:

22.07.2025

Ort der Veranstaltung:

[Wallonie](#)

Struktur:

[CPL-Végémar](#)

Thématique(s):

[Agriculture](#) [Production durable](#) [Agriculture biologique](#) [Productions végétales](#) [Couverts végétaux](#) [Maraichage](#) [Climat](#) [Environnement](#) [Energies](#) [Changement climatique](#) [Adaptations](#)

Dokumente, die der autor mit diesem inhalt verknüpft hat

