

[Projets R&D et essais démonstratifs + résultats](#)

[Influence de la fertilisation azotée sur le rendement et la qualité du colza d'hiver](#)

Publication date:
17.02.2025

Share



Résultats d'essais à Gembloux (Récoltes 2020 à 2024)

Les besoins en azote (N) de la culture du colza d'hiver sont importants, à partir de la reprise de végétation au printemps. Pour répondre à ces besoins, un apport d'azote est nécessaire, sous forme minérale ou organique. L'azote va contribuer à un bon développement de la culture (formation de biomasse) et sera un constituant des protéines que l'on retrouve dans les graines de colza à la récolte.

Les teneurs en huile et en protéines des graines de colza évoluent en fonction de la fumure azotée apportée à la culture de colza d'hiver. Les conditions climatiques de l'année influencent également les teneurs des graines récoltées.

Related document

Documents

Walakis Colza Influence fumure azotée sur rendement et qualité 2020 à 2024.pdf

Practical info

Published on:

17.02.2025

Last updated:

20.11.2025

Author(s)

CePiCOP

Document date:

15.02.2025

Document language

French

Territory(ies) :

[Europe](#) [Belgique](#) [Wallonie](#) [Province de Namur](#)

Structures:

[Centre Pilote Céréales et Oléo-protéagineux \(CePiCOP\)](#)

Thématique(s):

[Agriculture](#) [Productions végétales](#) [Oléagineux](#) [Climat](#) [Environnement](#) [Energies](#) [Changement climatique](#) [Impacts](#) [Sol](#) [Fertilisation](#)

Documents that the author has linked to this content