
[Projets R&D et essais démonstratifs + résultats](#)

[Influence de la fertilisation azotée sur le rendement et la qualité du colza d'hiver](#)

Date de publication:
17.02.2025

Partager

- 
- 
- 
- 

Résultats d'essais à Gembloux (Récoltes 2020 à 2024)

Les besoins en azote (N) de la culture du colza d'hiver sont importants, à partir de la reprise de végétation au printemps. Pour répondre à ces besoins, un apport d'azote est nécessaire, sous forme minérale ou organique. L'azote va contribuer à un bon développement de la culture (formation de biomasse) et sera un constituant des protéines que l'on retrouve dans les graines de colza à la récolte.

Les teneurs en huile et en protéines des graines de colza évoluent en fonction de la fumure azotée apportée à la culture de colza d'hiver. Les conditions climatiques de l'année influencent également les teneurs des graines récoltées.

Documents liés

Documents

Walakis Colza Influence fumure azotée sur rendement et qualité 2020 à 2024.pdf

Infos pratiques

Publié le:

17.02.2025

Mise à jour:

20.11.2025

Auteur(s)

CePiCOP

Date du document:

15.02.2025

Langue du document

Français

Territoire(s):

[Europe](#) [Belgique](#) [Wallonie](#) [Province de Namur](#)

Structure(s):

[Centre Pilote Céréales et Oléo-protéagineux \(CePiCOP\)](#)

Thématique(s):

[Agriculture](#) [Productions végétales](#) [Oléagineux](#) [Climat](#) [Environnement](#) [Energies](#) [Changement climatique](#) [Impacts](#) [Sol](#) [Fertilisation](#)

Documents que l'auteur a reliés à ce contenu